Doppelaugen

Vass8R05s141-145

INCA

Collection Vassal-Montpellier

diátadiamadantadantad

oMtp318

Doypel augen FH 8 RSAMM-MS





uluituuluutuuluutuuluutuul



nhaitanhaitanhaitanhaitanh

ANNEE 1987 NOM Doppel augen EMPLACEMENT 8 R5 1 141-145

<u>Inntimilantia di minimila di </u>

dicitordicatordentical

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f	Vé début	raisor mi/v	Maturité
-	3	31.3	7,4	0						
2	4	31,3	3,4	0						
3	4	27.3	31,3	0						
4./	3	27.3	31,3	0						
5	/									
					0					
	14!		3.4	0	U			Port	énge!	
			+7					Port Vegu	eu 2	

ANNEE 1988 NOM Doppel augen

EMPLACEMENT

8 R5 x 141.145

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé: début	raisor mi/v	Maturité
1 2 3 4	4 4 4 4	25.3 28.3 25.3	28:3 28:3 1:4 28:3	0 0 0 0	0						
	I	Pourrit	+4	Po	ort:	w engi a l' Couche	Vigu	eur :	2 faible		

ANNEE 1989 NOM Doffel augen EMPLACEMENT 8 RS & 141-145

doitedeatedeatedeated

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3	4 2	203 203 463	23.3	.11. :	0	Port	en	'g'i'	Vic	gueur	:2,5	

NOM Doppel augen EMPLACEMENT 8 kg 5 s 141. 145

Souche Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison Matur	rité
yeux déput mi/deb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Matur  1	

ANNEE /992

NOM Doffel angen EMPLACEMENT 8 R5 1141. 145

duitudintudintudintud

Souche	Nbre yeux	rrement mi/déb							raison mi/v	Maturité
1 2 3 5	4 4		0 0 0	Pour : Baie : Couleu	TG - (disc-s r : B-( : s - : avec	Mil G - M Sph-el Gr-Rs- m - a	1 : - P D: 1-ov-( Rg-N r - fo	im : obov-cy <u>Jus</u>	yl-fus : inc	L - M -C

ANNEE: 1996

MOM Dayel augen EMPLACEMENT 8 R5 1 141 145

	00			4				-									
	66	. 214	.79							1		-	1				
	tche	Mbre	Débou	rrement	ubre	Ferti-		raison			raison		Maturité				
	tene	уеих	début	mi/deb	grap	lité	döbut	mi/E	fin	début	mi/v	fin	TROCKE & GC				
			m														
	1	5	2812	413 *	0												
	2	6	28:2	413 * 14.3 *	0												
	3	7.	11.3	18.3.	0	Grappe	Crappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C										
8	J. J.	0	le M.3	,96(-5)		Pour: Mill: Baie: TG - G - M - P Dim:											
ı	5	1		,		pare:					-1 - Eug						
ı		V								obov-cy							
8						Couleu	$\underline{r} : P - 0$	Gr-Rs-	Rg-N	Jus	: inc	- GC	oloré				
8						Saveur	: 5 -	m - a	r - fe	ox - he	erb						
ı						Pépins	: avec	c - ap	yrène								
8			,	7		Port: Vigueur:											
ı											.,						
ı																	
		1			1	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA											

29/4554

duitedentedentedented

AMMET.: 1997
im Doffel augen

EMPLACEMENT 8R 5 A144.145

iche	Whre yeux	ur men! . mi/dob			Ulo debut	raison  mi/E		vé. děbůt	raison   mi/v		Datur 116
1 2	7 TL 12 TL		A		121,5	195	26.5	22,7	4.8	M.8	299
3	MYTL		2	Four :	те - с disc-s <sub>[</sub> t <sub>i</sub> : в-с : s -	Mil ; - !! oh-ell ir-Rs-! m - a:	l: - P l - ov-ol Rg-N r - fo	Dim: pov-cyl	-fus inc		: 1 ::- C

AMULEL: HOM D		augen		BMPLAC	ESPINO	8 R:	5 p 1	hd-14.	5		TL
whe When	Débou début	rrement mi/dôb	Ubre grap	Ferti- lité		raison  mi/E		vé début	raison mi/v	fin	Maturit <b>é</b>
TL: 10			500 15		: G	M - P  Mil  5 - M  sph-el  Gr-Rs- m - a	Dim  L: - P D  1-ov-  Rg-N  r - fe	im : obov-c	Compa y1-fus : inc	l cité:	24'.8 +2 1, - i1 -C

N° d'ordre : Doppel augen el 8 RS s MM-145 (s. 141) Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

4

Umministration (

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse att.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres (199) - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente (280) - sans villosité laineuse (281)

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées (211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

## Face inférieure

Nervures: glabre 2 30- séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 2(1) duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 2/82 sans villosité laineuse 283).

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe pfan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

#### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte (33) A pétiole glabre 231 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 287 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calno 87

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

4

<u>Juntanianta</u>niantania

Doffel augen 8 RS s-141-145 (5.144)

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

doited antique to factor

A contour uni - anguleux - cotelé. Glabre 242) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 25) - à raies 252 - vert 253. dos coloré 254 da raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259. : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movemne - longue - très longue.

: coloré 26 vert 265. Bourgeon

#### (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement: mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Doylel augen

N° d'ordre:

Désignation:

8 R50-141-145 (5.143)

Emplacement:

#### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne (42 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -

aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 157 - séteux 151 - velouté 152 -

divitadio tadenti oficiali

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - movenne-

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée (58 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172.

Glabre (73 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré (76 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvost

# Formulaire de description 5/8

divitanlantanlantanlantaal

(maturité)

4 Juntum multi

Observateur: La combe Année : 1998 Code clone Code cépage Emplacement: 8 R 5 5 14-145 Nom cépage: Joje Jugen talle loque Grappe oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm)(3)- moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9. oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3- moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9 oiv 204 compacité: très lâche 1 lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9. confue de probable oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5- long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 🕡 oiv 208\* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2. oiv 209\* présence d'un aileron : absent(1)- une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4. Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue 23 (20-26mm) - très longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) (5)- large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3 oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1) rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme 1 - uniforme 2. oiv 227 pruine nulle ou très faible 1 - faible 3- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - tres épaisse 9 oiv 229 ombilic: peu apparent 1- apparent 2. oiv 230\* coloration de la pulpe : non coloree 1, coloree 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée (1) coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9 oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2) oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne(5)- élevée 7 - très élevée 9 oiv 236 saveur : aucune D- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5. oiv 236\* saveur : aucune 1)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4. oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm)(3)- moyen (8-12mm)(5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyer 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents (3.) oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (>10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes (1)- présentes 2

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

Denomination: Doppel augen
EMPLACEMENT: R5 s 141. 145 (5.2)

44

luniminali miniminali miniminali m

#### SARMENT DE VIGNE

sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) 
duveteux (8) - cotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

ulmituulmutuulmutuulmutuul

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). saillant (1) - effecé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 88

N° d'ordre : Désignation : Doyyel augen Emplacement : 8 K 5 & 141 145

44

Juntuuluuti<mark>uluuluulu</mark>

```
: (1)-(2) - 3
Angle des nervures
Sexe
                                   : (7-(8) - 9

: (10) - 11

: 12 - 13 - (14) - (15) - 16
L1/L2
L2/L
Prof. sinus latéral Sup. : 12 - 13 - (14) - (15) - 16

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Nombre de lobes
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                        : (40 - 41)
Dents : forme
                                       : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
 Largeur du sinus pétiolaire
```

doitadantadeatadantad

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 90